

 <p>Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo</p>	PROCEDURA	Lab. Analisi
	ESAME DELLE FECI	
	Revisione 6 Pagina 1 di 5 Maggio 2026	

Procurarsi in farmacia o al supermercato uno o più contenitori idonei per la raccolta delle feci (contenitore munito di cucchiaino interno).

SANGUE OCCULTO FECALE

MODALITA' DI RACCOLTA:

➤ **SE IL CAMPIONE VIENE RACCOLTO E CONSEGNATO NELLA STESSA GIORNATA:**

1. Scrivere sul contenitore nome, cognome e data di nascita
2. Raccogliere, con l'apposito cucchiaino del contenitore, un quantitativo di feci in modo tale da riempire **il recipiente a metà (la quantità dovrà comunque essere almeno pari ad una "noce")**. Richiudere accuratamente il contenitore
3. Consegnare il campione **fresco della giornata** al punto prelievi del laboratorio

➤ **SE IL CAMPIONE VIENE RACCOLTO NELLA GIORNATA PRECEDENTE:**

Utilizzare il **dispositivo SENTIFIT PIERCE TUBE**, reperibile presso il punto prelievi della Casa di Cura:

1. Scrivere sul dispositivo **SENTIFIT PIERCE TUBE** nome, cognome e data di nascita
2. Raccogliere le feci direttamente sulla carta igienica, **evitando il contatto con acqua e urina**
3. Tenendo il dispositivo dritto, svitare il tappo verde con lo stick di raccolta. Non agitare capovolgendo il dispositivo.
4. Inserire lo stick nelle feci in **4 punti diversi** e strisciare a croce sulla superficie. **Non prelevare feci in eccesso: devono essere ricoperte di feci solamente le scanalature dello stick**
5. Reinserire il tappo verde ed avvitare a fondo. Non riaprire. Agitare delicatamente il dispositivo capovolgendolo
6. **Conservare in frigorifero** il dispositivo e consegnarlo prima possibile al punto prelievi del laboratorio

N.B.

In caso di tre campioni, i dispositivi devono essere raccolti in tre giornate diverse, conservati in frigorifero e consegnati tutti insieme il terzo giorno.

 <p>Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo</p>	PROCEDURA	Lab. Analisi
	ESAME DELLE FECI	Revisione 6 Pagina 2 di 5 Maggio 2026

Non eseguire il Test durante il periodo mestruale, in presenza di emorroidi sanguinanti o di sangue nelle urine e se vi è diarrea (occorre attendere che l'attività intestinale si normalizzi).

NON VENGONO ACCETTATI CAMPIONI RACCOLTI CON LA MODALITA' DELS.S.N.

ESAME CULTURALE DELLE FECI (COPROCOLTURA)

L'esame culturale delle feci prevede la ricerca di:

- Salmonella
- Shigella
- Campylobacter

MODALITA' DI RACCOLTA:

- Scrivere sul contenitore nome, cognome e data di nascita
- Prelevare le feci possibilmente all'esordio della sintomatologia quando sono diarroiche e **PRIMA dell'inizio della terapia antibiotica**
- Raccogliere, con l'apposito cucchiaino del contenitore, un quantitativo di feci in modo tale da riempire **il recipiente a metà (la quantità dovrà comunque essere almeno pari ad una**
- **"noce"**). Durante la raccolta, prestare attenzione a non contaminare le feci né con l'acqua dei sanitari, né con l'urina per non compromettere l'esito microbiologico
- Richiudere accuratamente il contenitore. Consegnare il campione **fresco della giornata** al punto prelievi del laboratorio

 <p>Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo</p>	PROCEDURA	Lab.Analisi
	ESAME DELLE FECI	Revisione 6 Pagina 3 di 5 Maggio 2026

Su richiesta specifica, possono essere ricercati:

- Yersinia enterocolitica
- E.Coli O:157
- Candida

RICERCA VIRUS NELLE FECI

Solitamente l'esame prevede la ricerca di Rotavirus e Adenovirus.

MODALITA' DI RACCOLTA:

- Scrivere sul contenitore nome, cognome e data di nascita
- Eseguire la raccolta possibilmente il mattino del giorno in cui il campione verrà consegnato al punto prelievi. Nel caso in cui si proceda alla raccolta la sera precedente, conservare il campione a 2-8°C e consegnarlo la mattina seguente
- Raccogliere, con l'apposito cucchiaino del contenitore, un quantitativo di feci in modo tale da riempire il recipiente a metà (la quantità dovrà comunque essere almeno pari ad una "noce")
- Richiudere accuratamente il contenitore

RICERCA PARASSITI INTESTINALI

L'esame parassitologico delle feci prevede la ricerca di protozoi (esclusa la Dientamoeba fragilis), elminti e le loro uova (esclusa Anisakis).

Per la ricerca dei parassiti **intestinali è raccomandato raccogliere almeno tre campioni in tre giorni differenti**. Questo perché l'eliminazione di cisti/uova/larve è saltuaria e dipende dal ciclo biologico del parassita.

Per eseguire l'esame, il paziente **NON DEVE AVER ASSUNTO** da almeno una settimana:

olio di vaselina, bario, bismuto, **antibiotici**, antimalarici e **farmaci antidiarroici non assorbibili**.

MODALITA' DI RACCOLTA:

- Scrivere sul contenitore nome, cognome e data di nascita
- Eseguire la raccolta il mattino del giorno in cui il campione verrà consegnato al punto prelievi **(feci fresche)**

 <p>Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo</p>	PROCEDURA	Lab. Analisi
	ESAME DELLE FECI	Revisione 6 Pagina 4 di 5 Maggio 2026

ATTENZIONE: Si ricorda che, se sono necessari più campioni, devono essere prelevati in giorni differenti e consegnati **il giorno stesso del prelievo**

- Raccogliere, con l'apposito cucchiaino del contenitore, un quantitativo di feci in modo tale da riempire **il recipiente a metà (la quantità dovrà comunque essere almeno pari ad una "noce")**. Durante la raccolta, prestare attenzione a non contaminare le feci né con l'acqua dei sanitari, né con l'urina
- Richiudere accuratamente il contenitore

CALPROTECTINA ED ELASTASI FECALE

MODALITA' DI RACCOLTA:

- Scrivere sul contenitore nome, cognome e data di nascita
- Eseguire la raccolta il mattino del giorno in cui il campione verrà consegnato al punto prelievi. Nel caso in cui si proceda alla raccolta la sera precedente, conservare il campione a 2-8°C e consegnarlo la mattina seguente. **Evitare di raccogliere il campione qualora le feci non siano solide.**
- Svuotare la vescica e raccogliere, con l'apposito cucchiaino del contenitore, un quantitativo di feci in modo tale da riempire **il recipiente a metà (la quantità dovrà comunque essere almeno pari ad una "noce")**. Assicurarsi che il campione non venga in contatto con l'acqua dei sanitari.
- Richiudere accuratamente il contenitore

 <p>Casa di Cura Madre Fortunata Toniolo</p>	PROCEDURA	Lab. Analisi
	ESAME DELLE FECI	
	Revisione 6 Pagina 5 di 5 Maggio 2026	

ZONULINA E CHIMOTRIPSINA FECALE

Prima di eseguire l'esame, è necessario contattare la segreteria del punto prelievi.

MODALITA' DI RACCOLTA:

- Scrivere sul contenitore nome, cognome e data di nascita
- Eseguire la raccolta il mattino del giorno in cui il campione verrà consegnato al punto prelievi. Nel caso in cui si proceda alla raccolta la sera precedente, conservare il campione a 2-8°C e consegnarlo la mattina seguente. **La raccolta del campione deve essere eseguita su un campione di feci solide.**
- Svuotare la vescica e raccogliere, con l'apposito cucchiaino del contenitore, un quantitativo di feci in modo tale da riempire **il recipiente a metà (la quantità dovrà comunque essere almeno pari ad una "noce")**. Assicurarsi che il campione non venga in contatto con l'acqua dei sanitari.
- Richiudere accuratamente il contenitore

HELICOBACTER PYLORI

L'indagine è richiesta per la ricerca antigenica dell'Helicobacter Pylori nelle feci.

Il campione deve essere prelevato prima della somministrazione di antibiotici o almeno 7-10 giorni dopo la sospensione della terapia. Qualora non fosse possibile, bisogna sapere che le terapie antibiotiche possono interferire sull'esito dell'esame.

MODALITA' DI RACCOLTA:

- Scrivere sul contenitore nome, cognome e data di nascita
- Eseguire la raccolta il mattino del giorno in cui il campione verrà consegnato al punto prelievi. Nel caso in cui si proceda alla raccolta il giorno precedente, conservare il campione a 2-8°C e consegnarlo la mattina seguente
- Raccogliere, con l'apposito cucchiaino del contenitore, un quantitativo di feci in modo tale da riempire **il recipiente a metà (la quantità dovrà comunque essere almeno pari ad una "noce")**.
- Richiudere accuratamente il contenitore

E' POSSIBILE CONSEGNARE I CAMPIONI AL PUNTO PRELIEVI DEL LABORATORIO ANALISI DAL LUNEDI' AL SABATO DALLE ORE 7.00 ALLE ORE 9.30, PRELEVANDO UN BIGLIETTO DAL NUMERATORE E ATTENDENDO IL PROPRIO TURNO