



MODULO	P - SED - 01
PREPARAZIONE PER AGOBIOPSIA PROSTATICA	Revisione 2 Pagina 1 di 1 Febbraio 2009

1. Rimanere a digiuno almeno 6 ore prima dell'esame.
2. Eseguire una buona toilette intestinale con clistere evacuativo 4-5 ore prima dell'esame.
3. Rivolgersi al medico curante o allo specialista per la terapia antibiotica profilattica a base di fluorchinolonico, salvo controindicazioni, da assumersi a partire dal giorno prima dell'esame e per i quattro giorni successivi.
4. Rivolgersi al medico curante o allo specialista per la terapia antibiotica profilattica nei pazienti affetti da valvulopatia cardiaca da assumere secondo quanto previsto per la profilassi dell'endocardite batterica.
5. Sospendere, previo consenso del cardiologo o del medico curante, eventuale terapia con farmaci antiaggreganti o anticoagulanti orali nei sette giorni prima dell'esame e per i 3-4 giorni successivi.
6. E' consigliabile effettuare esami ematici per valutare l'emocromo ed i parametri della coagulazione quali PT, PTT e piastrine, nei 15 giorni che precedono l'esame.
7. Si ricorda inoltre di portare la documentazione relativa al dosaggio del PSA ed eventuali referti di altri esami diagnostici e/o relativi a visite specialistiche.